

La ikke dagen få en brå forSTOPPelse

Treg mage og midlertidig forstoppelse er et vanlig problem i befolkningen. En undersøkelse viser at rundt 40 % av befolkningen har vært plaget med treg mage eller forstoppelse i løpet av de siste 12 mnd.¹ Mange kjenner derfor den ubehagelige følelsen av å måtte gå på toalettet, men ikke få det til.

Behovet for å gå på toalettet er forskjellig fra person til person. Noen går tre ganger om dagen, andre bare et par ganger i uken. Hva som er normalt for en person kan være unormalt for en annen. Det er viktig at man går på toalettet når man selv kjenner at man må.

Men når problemet først er der, finnes det en behagelig løsning på dette ubehagelige problemet. Dulcolax® og Laxoberal® er avføringsmidler som gir effektiv hjelp på en enkel måte.

¹GfK/sept 2000.

Dulcolax® og Laxoberal® bør bare brukes i korte perioder. Ved bruk ut over anbefalt behandlingstid eller ved endrede avføringsvaner må lege kontaktes. Les pakningsvedlegg nøye før bruk.

Fås kjøpt i alle apotek.

www.dulcolax.no



Boehringer Ingelheim Norway KS
Consumer Health Care
Drengsrudbekken 25
Pb. 405, 1373 Asker
Tlf.: 66761300

arell.no 10248

Dulcolax

Laxoberal

Hjelp ved forstoppelse



Boehringer
Ingelheim

Årsaker til forstoppelse kan være:

- Inntak av for lite væske
- Endring i rutiner, som f.eks ferier, stress, reiser etc.
- Alder – eldre mennesker opplever forstoppelse hyppigere enn yngre
- Neglisjering av toalettbesøk
- Hormonelle endringer som f.eks graviditet og overgangsalder
- Enkelte legemidler
- Enkelte sykdommer, som f.eks Parkinsons sykdom, diabetes m.fl.

Effektiv behandling

Dulcolax® og Laxoberal® er tarmstimulerende avføringsmidler som har god effekt ved tilfeldig forstoppelse. De aktive stoffene bisakodyl og natriumpikosulfat omdannes i tykktarmen til virksomme substanser som stimulerer tarmens naturlige bevegelser til å transportere tarminnholdet raskere. Samtidig holdes vann tilbake i tarmen, noe som medfører at avføringen får en mykere konsistens og tarmtømmingen lettes. Legemidlene har kun effekt i tykktarmen og har dermed ingen negativ innvirkning på andre organer eller fordøyelsen.



Laxoberal

Dråper

Dosering voksne og barn over 12 år: 5–10 dråper, individuell dosering etter behov. Dråpene er uten smak, lukt eller farge og kan blandes i mat eller drikke. Laxoberal® virker kun lokalt i tykktarmen. Effekt oppnås etter 6–12 timer (over-natten-effekt).



Dulcolax

Enterotabletter

Dosering voksne og barn over 10 år: 1–2 enterotabletter daglig før sengetid. Barn på 10 år eller yngre med kronisk forstoppelse må bare behandles etter råd fra lege. Dulcolax må ikke brukes av barn på 2 år eller yngre. Tablettene er drasjert med en syrebeskyttende hinne som løses opp i tykktarmen, de skal derfor ikke knuses. Melk eller syrenøytraliserende midler bør unngås en time før eller samtidig med inntak av Dulcolax® tabletter. Effekt oppnås etter 6–12 timer (over-natten-effekt).



Dulcolax

Stikkpiller

Dosering voksne og barn over 10 år: 1 stikkpille for umiddelbar effekt (ca. 20 min.). Barn på 10 år eller yngre med kronisk forstoppelse må bare behandles etter råd fra lege. Dulcolax må ikke brukes av barn på 2 år eller yngre. Virkestoffet spaltes av enzymer i endetarmen og nedre del av tykktarmen og gir stimulerende effekt i disse områdene.

