

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må LAXOBERAL brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 7 dager.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva LAXOBERAL er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker LAXOBERAL
3. Hvordan du bruker LAXOBERAL
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer LAXOBERAL
6. Ytterligere informasjon

1. HVA LAXOBERAL ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Laxoberal er et tarmstimulerende avføringsmiddel, hvor det aktive stoffet, natriumpikosulfat, omdannes i tykktarm og endetarm til virksom substans som øker tarmbevegelsen, slik at tarminnholdet transporteres raskere. Samtidig holdes vann tilbake. Dette medfører at avføringen får en mykere konsistens og tarmtømmingen lettes.

Laxoberal brukes ved midlertidig forstoppelse.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER LAXOBERAL

Bruk ikke LAXOBERAL:

- dersom du har magesmerter og kramper
- dersom du har sterke magesmerter og kramper etterfulgt av kvalme og oppkast
- dersom du har betennelsestilstander i tynn- og tykktarm
- dersom du har forsnevring i tarmen- dersom du har alvorlig uttørking
- dersom du har kjent overfølsomhet for natriumpikosulfat eller noen av hjelpestoffene
- dersom du har en sjelden arvelig intoleranse for noen av hjelpestoffene

Vis forsiktighet ved bruk av LAXOBERAL:

- dersom du har brukt Laxoberal regelmessig og langvarig- dersom du har endrede avføringsvaner
- Som med alle avføringsmidler må ikke Laxoberal brukes daglig eller over lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen.

Langvarig bruk skal bare skje i samråd med lege. Ved endrede avføringsvaner må lege kontaktes.

Skal ikke gis til barn under 12 år uten etter avtale med lege.

Inntak av LAXOBERAL sammen med mat og drikke:

Laxoberal kan blandes i mat eller drikke.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Det er liten erfaring ved bruk av Laxoberal ved graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Laxoberal dersom du er gravid.

Laxoberal går ikke over i morsmelk og kan brukes under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdstoffene i Laxoberal

Laxoberal dråper inneholder sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

Bruk av andre legemidler sammen med LAXOBERAL:

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Samtidig bruk av antibiotika kan redusere virkningen av Laxoberal.

3. HVORDAN DU BRUKER LAXOBERAL

Voksne: 10 dråper om kvelden.

Dosen bør tilpasses individuelt slik at avføringen blir passe myk.

Anbefalt doseringsprogram: 5 – 10 dråper (unntaksvis 15 dråper) som startdose første kvelden.

Deretter kan antall dråper minskes eller økes slik at avføringen får ønsket konsistens. Etter en ukes behandling kan preparatet tas hver 2. eller hver 3. dag i en nedtrappingsperiode på ca. 2 uker.

Laxoberal virker etter 6 – 12 timer.

Bruksanvisning:

Laxoberal doseres dråpevis ved å holde flasken opp ned og samtidig trykke lett i bunnen

Hvis du mener at virkningen av Laxoberal er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Dersom du tar for mye av LAXOBERAL:

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Symptomer på overdosering kan være diaré og magekramper.

Dersom du har glemt å ta Laxoberal

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Laxoberal forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Mage-tarm besvær:

Svært vanlige bivirkninger(forekommer hos mer enn 1 av 10 pasienter): Løs mage (diaré).

Vanlige bivirkninger (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter og mindre enn 1 av 10 pasienter):
Uvelhet, mageknip, magesmerter.

Kvalme og oppkast har forekommet hos noen pasienter (frekvens ikke kjent).

Allergiske reaksjoner:

Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås):

Allergiske reaksjoner, bl.a. med hudreaksjoner og hevelse i huden og munnens slimhinner (angioødem).

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. OPPBEVARING AV LAXOBERAL:

Oppbevares ved høyst 30° C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Laxoberal etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter *Utløpsdato*. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetningen av Laxoberal

- virkestoffet er natriumpikosulfat. 1 ml Laxoberal dråper inneholder: 7,5 mg natriumpikosulfat. 1 dråpe tilsvarer 0,5 mg natriumpikosulfat.
- Hjelpesoffer er sorbitol flytende (ikke krystalliserende) 450 mg, natriumbenzoat (konserveringsmiddel), natriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, vann til 1 ml.

Hvordan Laxoberal ser ut og innholdet i pakningen

Laxoberal dråper har en klar fargeløs/ svak gul til gulbrun farge, og er svakt viskøs.
Flasken inneholder 30 ml.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Boehringer Ingelheim GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.

Tilvirker

Instituto De Angeli S.r.l, Regello, Italia.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Boehringer Ingelheim Norway KS, Postboks 405, 1373 Asker.

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 2011-04-13